HOJA INFORMATIVA

FOSETIL – AL 80 WG

FUNGICIDA ESPECÍFICO (ALIETTE® WG)

fungicidas

en forma de
"GRANULADO DISPENSABLE EN AGUA" (WG)

Fosetil Al ..... 80% p/p

CARACTERÍSTICAS

El **Fosetil Al** es un fungicida de acción preventiva y curativa a base de FOSETIL-AL que presenta una traslocación ascendente y descendente que le confiere un carácter único para combatir, por vía foliar, las **enfermedades del cuello, tronco y raíces** debidas a la fitophtora (como la Gomosis Infecciosa de los Cítricos producida por *Phytophthora* spp.) Además FOSETIL-AL, al metabolizarse en la planta, aumenta las defensas naturales de la misma frente a futuras infecciones.

APLICACIONES AUTORIZADAS

FRUTALES DE PEPITA, AGUACATE Y FRESALES: Contra *Phytophthora* spp. (Podredumbre) y efecto complementario contra Bacteriosis (Envejecimiento de las hojas y desecación de las frutas).

CÉSPEDES (deportivos o de esparcimiento): Contra *Phytophthora* y *Pythium* (Pequeñas manchas de 10-20 cm de aspecto graso-encharcado color verde oscuro, que llegan a adquirir un tamaño de hasta 60 cm. Finalmente las plántulas mueren, se vuelven color marrón y posteriormente naranja. La enfermedad se extiende siguiendo el desplazamiento del agua, provocando manchas amarillas).

CÍTRICOS: Contra Aguado, Gomosis Parasitaria o Podredumbre del Cuello y de la Corteza (*Phytophthora* spp.).

CIPRESES Y OTRAS CUPRESÁCEAS EN VIVEROS: Contra Marchitamiento debido a la *Phytophthora* spp.

CUCURBITÁCEAS (Melón, Calabacín, Calabaza, Pepino, Sandía, etc.): Contra Mildiu.

Beltrán Báguena, 5• E-46009 Valencia• telf. 96 348 35 88• fax. 96 349 77 27 • e-mail: sipcamjardin@sipcam.es

HOJA INFORMATIVA

DOSIS y MODO DE EMPLEO

En general, el contenido de este envase (40 gramos) es la dosis adecuada para una mochila. Un dosificador (5 ml) es la dosis adecuada para un pulverizador de 1 litro.

Cultivo	Aplicación	Dosis
CÉSPEDES (deportivos o de esparcimiento)	Pulverización Foliar (En primavera y principios de verano)	40 g / 3 litros de agua para 30 m2
FRUTALES DE PEPITA , AGUACATE Y FRESALES	Pulverización Foliar en crecimiento activo de la planta (Contra bacteriosis 2-3 tratamientos que cubran la época de floración)	40 g /15 litros de agua
CUCURBITÁCEAS	Pulverización Foliar en crecimiento activo de la planta	
CÍTRICOS	Contra gomosis Riego Localizado (2 aplicaciones máx. por campaña)	1-25 g / árbol
CIPRESES Y OTRAS CUPRESÁCEAS EN VIVEROS	Riego	10 g/m2

PREPARACIÓN DEL CALDO

Verter en un recipiente la cantidad de formulado necesario para la capacidad del aparato pulverizador (mochila, tanque, etc.). Añadir un poco de agua hasta formar una papilla homogénea. Añadir la papilla al aparato de pulverizar, que deberá estar lleno de agua hasta su mitad y terminar de llenarlo agitando.

INCOMPATIBILIDADES

Incompatible con dicofol, aceite y productos a base de cobre.
En caso de tratar con aceite, hacerlo una semana después de la aplicación con Fungicida Específico Sipcam Jardín.
Incompatible con abonos foliares a base de nitrógeno mineral. Estos abonos se podrán aplicar posteriormente a los cultivos.

PLAZO DE SEGURIDAD

Entre el último tratamiento y la recolección 7 días en Fresales y 15 días en el resto de cultivos autorizados.

DATOS DEL REGISTRO

- **Nº de Registro:** 15.907
- **Clasificaciones para la fauna:**
  - Mamíferos : A
  - Aves : A
  - Peces : A
  - Abejas : Compatible con abejas.

Xi

Irritante

Beltrán Báguena, 5• E-46009 Valencia• telf. 96 348 35 88• fax. 96 349 77 27 • e-mail: sipcamjardin@sipcam.es